

# Bicalutamid HEXAL® 50 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Bicalutamid

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

## Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten beachten?
3. Wie ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



## 1 Was ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten und wofür wird es angewendet?

Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die Antiandrogene genannt werden. Es hat Auswirkungen auf einige Wirkungen der männlichen Geschlechtshormone.

Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten wird zur Behandlung des Prostatakarzinoms angewendet. Es wird entweder angewendet als

- **Monotherapie** bei Tumorstadien, die als „lokal fortgeschritten“ bezeichnet werden, oder als
- **Kombinationstherapie** bei Tumorstadien, die als „fortgeschritten“ bezeichnet werden, zusammen mit anderen Behandlungsmethoden wie z. B. chirurgische Kastration oder Arzneimitteln, die den Androgenspiegel im Körper senken.

## 2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten beachten?

**Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten darf nicht eingenommen werden**

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen Bicalutamid oder einen der sonstigen Bestandteile von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten sind
- wenn Sie eine Frau, ein Kind oder ein Jugendlicher sind
- wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, die Terfenadin, Astemizol oder Cisaprid enthalten (siehe „Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln“).

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten einnehmen:

- wenn Sie Leberprobleme haben. Es könnte zu einer Erhöhung der Bicalutamid-Spiegel im Blut kommen. Es ist möglich, dass Ihre Leberfunktion periodisch überprüft wird.
- wenn Sie Diabetiker sind.

### Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Es ist besonders wichtig zu erwähnen, wenn Sie eines der folgenden Arzneimittel einnehmen:

- Terfenadin oder Astemizol (bei Heuschnupfen oder Allergien) oder Cisaprid (bei Magenkrankungen) (siehe „Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten darf nicht eingenommen werden“)
- Warfarin oder ähnliche Arzneimittel zur Verhinderung von Blutgerinnseln
- Ciclosporin (zur Unterdrückung des Immunsystems, um die Abstoßung eines transplantierten Organs oder des Knochenmarks zu verhindern)
- Kalziumkanalblocker (zur Behandlung des Bluthochdrucks oder einiger Herzerkrankungen)
- Cimetidin (zur Behandlung von Magengeschwüren)
- Ketoconazol (zur Behandlung von Pilzinfektionen der Haut und Nägeln)

### Schwangerschaft und Stillzeit

Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten wird bei Frauen nicht angewendet. Daher darf Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten nicht von Frauen eingenommen werden, einschließlich schwangere Frauen oder stillende Mütter.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Diese Tabletten können zu Schwindel oder Benommenheit führen. Wenn Sie davon betroffen sind, sollten Sie nicht Auto fahren oder Maschinen bedienen.

### Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten enthält Lactose:

Bitte nehmen Sie Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

## 3 Wie ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten einzunehmen?

Nehmen Sie Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

In Abhängigkeit von Ihren Beschwerden beträgt die übliche Dosis eine 50 mg-Tablette täglich (Kombinationstherapie), oder drei 50 mg-Tabletten 1-mal täglich (Monotherapie).

- Schlucken Sie die Tabletten unzerkaut mit einem Glas Wasser.
- Sie können diese Tabletten mit oder ohne Nahrung einnehmen.
- Versuchen Sie, die Tabletten jeden Tag zur gleichen Zeit einzunehmen.

### Wenn Sie eine größere Menge von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Informieren Sie Ihren Arzt oder wenden Sie sich sofort an die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses. Falls möglich, nehmen Sie Ihre Tabletten oder die Faltschachtel mit, um dem Arzt zu zeigen, was Sie eingenommen haben.

### Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten vergessen haben

Wenn Sie die Einnahme Ihres Arzneimittels vergessen haben, nehmen Sie die Dosis, wenn Sie sich daran erinnern. Nehmen Sie danach die nächste Dosis zur üblichen Zeit. Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### Wenn Sie die Einnahme von Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten abbrechen

Brachen Sie die Einnahme Ihrer Tabletten nicht ab, auch wenn Sie sich gut fühlen, außer Ihr Arzt sagt es Ihnen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

### Schwerwiegende Nebenwirkungen

**Sie sollten unverzüglich Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie eine der folgenden schwerwiegenden Nebenwirkungen bemerken.**

### Häufige schwerwiegende Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 10 Patienten betreffen)

- Gelbfärbung der Haut oder des Augenweißes verursacht durch Leberprobleme oder in seltenen Fällen (kann bis zu 1 von 1.000 Patienten betreffen) Leberversagen.

### Gelegentliche schwerwiegende Nebenwirkungen (kann bis zu 1 von 100 Patienten betreffen)

- schwerwiegende allergische Reaktionen, die zu Schwellungen des Gesichts oder Rachens führen, oder starker Juckreiz der Haut mit Quaddelbildung
- schwere Atemnot oder plötzliche Verschlechterung einer Atemnot, möglicherweise mit Husten oder Fieber. Einige Patienten, die Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten einnehmen, bekommen eine Lungenentzündung, eine so genannte interstielle Lungenerkrankung.

### Andere Nebenwirkungen

Die Häufigkeit einiger Nebenwirkungen hängt davon ab, ob Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten in der Kombinationstherapie oder als Monotherapie angewendet wird.

### Sehr häufige Nebenwirkungen (kann mehr als 1 von 10 Patienten betreffen)

- empfindliches oder vergrößertes Brustgewebe
- Schwächegefühl

- Hautausschlag - sehr häufig in der Monotherapie und häufig (kann bis zu 1 von 10 Patienten betreffen) in der Kombinationstherapie
- Abnahme der roten Blutkörperchen, die zu blasser Haut und Schwäche oder Atemnot führen kann

*Sehr häufig in der Kombinationstherapie und häufig in der Monotherapie*

- Hitzewallungen
- Schwindel
- Bauchschmerzen, Verstopfung, Übelkeit (Unwohlsein)
- Ödeme
- Blut im Urin

**Häufige Nebenwirkungen** (kann bis zu 1 von 10 Patienten betreffen)

- Appetitverlust
- Abnahme der Libido
- Probleme bei der Erektion (erektiler Dysfunktion)
- Depression
- Benommenheit
- Schläfrigkeit
- Verdauungsstörungen, Blähungen (Winde)
- Haarausfall, übermäßige Körperbehaarung
- trockene Haut, Juckreiz
- Gewichtszunahme
- Bluttests, die Veränderungen der Lebertätigkeit zeigen
- Herzinfarkt
- Herzversagen
- Brustschmerzen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

## 5 Wie ist Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Blister nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten enthält

Der Wirkstoff ist Bicalutamid. Eine Filmtablette enthält 50 mg Bicalutamid.

Die sonstigen Bestandteile sind:

#### Tablettenkern

Lactose-Monohydrat, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), Povidon K 30, Maisstärke und Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

#### Filmüberzug

Methylcellulose, Titandioxid und Triacetin

### Wie Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten aussieht und Inhalt der Packung

Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten sind runde und weiße Filmtabletten.

Die Packungen mit Blistern können 30 oder 90 Filmtabletten enthalten.

### Pharmazeutischer Unternehmer

HEXAL AG  
Industriestraße 25  
83607 Holzkirchen  
Telefon: (08024) 908-0  
Telefax: (08024) 908-1290  
E-Mail: [service@hexal.com](mailto:service@hexal.com)



### Hersteller

Salutas Pharma GmbH  
Otto-von-Guericke-Allee 1  
39179 Barleben

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

Deutschland:	Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten
Irland:	Biluta 50 mg Film-Coated Tablets
Luxemburg:	Bicalutamid HEXAL 50 mg Filmtabletten
Die Niederlande:	Bicalutamide 50 mg, filmomhulde tabletten

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2012.**

**Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!**

46090514