

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Thrombareduct® Sandoz® 60 000 I.E./100 g

 Gel

Wirkstoff: Heparin-Natrium

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g Gel enthalten: 0,4 g Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein) entsprechend 60 000 I.E.

Sonstige Bestandteile:

Kiefernadelöl, Latschenkiefernöl, Levomenthol, Natriumedetat (Ph. Eur.), 2, 2', 2''-Nitrilotriethanol, Polyacrylsäure, Poly[oxyethylen]-6-glycerol(mono,di)-alkanoat (C₈-C₁₀), Polysorbat 80, Propan-2-ol, Sorbitol-lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 10 g (N 1), 40 g (N 1), 100 g (N 2), 200 g (N 3) Gel

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Zur Verminderung von Schwellungen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning, E-mail: info@sandoz.de

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei:

- akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen/Blutergüsse).
- oberflächlicher Venenentzündung, sofern diese nicht durch Kompression behandelt werden kann.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g nicht anwenden?

Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Heparin oder einen der sonstigen Bestandteile des Gels.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben.

Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g ist alkoholhaltig und darf daher nicht auf Schleimhäute, offene Wunden und/oder nässende Ekzeme sowie entzündete Hautstellen (z. B. Sonnenbrand) aufgebracht werden oder mit den Augen in Berührung kommen, da ein brennendes Gefühl entstehen kann.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g und wie oft sollten Sie Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g anwenden?

Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g soll 2- bis 3mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Nach der Anwendung sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.

Wie lange sollten Sie Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g ca. 1–2 Wochen anwenden.

Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden üblicherweise folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: Weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1 000 Behandelten	Selten: Weniger als 1 von 1 000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
Sehr selten: 1 Fall oder weniger von 10 000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g auftreten?

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind selten.

Jedoch können sehr selten allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Thrombareduct Sandoz 60 000 I.E./100 g soll beim Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch 1 Jahr haltbar.

Stand der Information

März 2004

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!