

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 62 51) 10 97-0 · Fax (0 62 51) 33 42  
<http://www.reckeweg.de>

*Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.*

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Lumbago-Gastreu® S R11

#### **Zusammensetzung:**

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis vulgaris Dil. D4 1 ml, Calcium phosphoricum Dil. D12 1 ml, Causticum Hahnemanni Dil. D6 1 ml, Dulcamara Dil. D4 1 ml, Rhododendron Dil. D4 1 ml, Rhus toxicodendron Dil. D4 1 ml. Die Bestandteile 2-4 und 6 werden gemeinsam über die vorletzte Stufe und alle Bestandteile gemeinsam über die letzte Stufe potenziert.

(1ml entspricht 17 Tropfen)

Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 Prozent (m/m).

Enthält 38 Vol.-% Alkohol

22ml / 50ml Mischung zum Einnehmen

#### **Stoff- und Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparates.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 06251 / 1097-0 · Fax: 06251 / 3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung rheumatischer Schmerzen.

*Hinweis:* Bei akuten Zuständen, die z.B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu aufgetretenen Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.


#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Giftsumachgewächse.

#### **Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:**

Kinder: Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:****Keine bekannt.**

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie bitte medizinischen Rat ein.

Enthält 38 Vol.-% Alkohol

**Dosierungsanleitung:**

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Beschwerden nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen ein.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Bei Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels können sich Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schwindelgefühl und/oder Benommenheit sowie Hautentzündungen zeigen. Bitte nehmen Sie unverzüglich Rücksprache mit einem Arzt.

**Nebenwirkungen:**

In sehr seltenen Fällen können – auch einige Tage nach Einnahme des Arzneimittels – Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreaktionen auftreten. In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die in dieser Gebrauchsinformation nicht aufgeführt sind, so teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Stand der Information: April 2006

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6276601.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**