



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 62 51) 10 97-0 · Fax (0 62 51) 33 42
<http://www.reckeweg.de>

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

GEBRAUCHSINFORMATION

Cysto-Gastreu® S R18

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Berberis vulgaris Dil. D4 1 ml, Dulcamara Dil. D4 1 ml, Equisetum hiemale (HAB 1934) Dil. D6 1 ml (Vorschrift 2a HAB), Eupatorium purpureum Dil. D6 1 ml. Gemeinsam potenziert über die letzten beiden Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40a, Berberis vulgaris nur über die letzte Stufe. Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 Prozent (m/m).

Enthält 37 Vol.-% Alkohol.

22ml / 50ml Mischung flüssiger Verdünnungen

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnorgane.

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim
Tel.: 06251 / 1097-0 · Fax: 06251 / 3342
<http://www.reckeweg.de>

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Blase und der ableitenden Harnwege.

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder beim Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**Keine bekannt.**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Cysto-Gastreu® S R18** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Cysto-Gastreu® S R18** sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahren je 5-10 Tropfen ein.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:**Keine bekannt.**

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Aufbewahrung:

Bei Raumtemperatur.

Stand der Information: Dezember 2003

Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277115.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.