



Dr. R. Pflieger

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Biofanal[®], Vaginaltabletten

Wirkstoff: Nystatin

Zusammensetzung

1 Vaginaltablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 000 I.E. Nystatin.

Sonstige Bestandteile: mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Maisstärke.

Darreichungsform und Inhalt

Biofanal, Vaginaltabletten, sind in Packungen mit 6 und 12 Vaginaltabletten erhältlich.

Biofanal, Vaginaltabletten, sind ein spezifisch gegen Hefepilze (*Candida albicans* und andere *Candida*-Arten) wirkendes Mittel zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Scheide.

Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH, D-96045 Bamberg, Telefon: 0951/60 43-0, Telefax: 0951/60 43 29.

E-Mail: info@dr-pflieger.de

Internet: www.dr-pflieger.de

Anwendungsgebiete

Vaginale *Candida*-Infektionen (Fluor, Vaginitis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Biofanal, Vaginaltabletten, nicht anwenden?

Biofanal, Vaginaltabletten, dürfen nicht angewendet werden bei anamnestisch bekannter Allergie gegen Nystatin oder einen der anderen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit möglich, da der Wirkstoff Nystatin bei der Anwendung von Biofanal, Vaginaltabletten, in der empfohlenen Dosierung kaum in die Blutbahn übergeht.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine bekannt.

Worauf müssen Sie noch achten?

Aufgrund des in den Biofanal, Vaginaltabletten, enthaltenen Wirkstoffs Nystatin sind gelbliche Verfärbungen der Unterwäsche möglich. Diese lassen sich durch normales Waschen wieder entfernen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Biofanal, Vaginaltabletten, oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Biofanal, Vaginaltabletten, beeinflusst?

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Biofanal, Vaginaltabletten, nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Biofanal, Vaginaltabletten, sonst nicht richtig wirken können.

Wie viel von Biofanal, Vaginaltabletten, wie oft, wie und wann sollten Sie Biofanal, Vaginaltabletten, anwenden?

Kurzzeittherapie: An 3 aufeinander folgenden Tagen sind vor dem Schlafengehen 2 Vaginaltabletten tief in die Scheide einzuführen.

12 Tage-Therapie: An 12 aufeinander folgenden Tagen ist vor dem Schlafengehen eine Vaginaltablette tief in die Scheide einzuführen.

Wie lange sollten Sie Biofanal, Vaginaltabletten, anwenden?

Durch eine ärztliche Nachuntersuchung sollte geklärt werden, ob die Behandlung erfolgreich verlaufen oder fortzusetzen ist. In letzterem Fall kann die Verlängerung der Behandlung bis zur endgültigen Abheilung sinnvoll sein. Hinweis: Bei wiederholtem Auftreten von vaginalen *Candida*-Infektionen sollte eine gleichzeitige Anwendung von Biofanal, überzogene Tabletten, erwogen werden. Zur Vermeidung von Reinfektionen wird eine Partnerbehandlung empfohlen.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Biofanal, Vaginaltabletten, in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Vergiftungserscheinungen sind auch bei Überdosierung von Biofanal, Vaginaltabletten, kaum zu erwarten, da der



in Biofanal, Vaginaltabletten, enthaltene Wirkstoff Nystatin bei vaginaler Anwendung nur in geringen Mengen in die Blutbahn übergeht. Verständigen Sie bei Verdacht auf eine Überdosierung bitte auf jeden Fall einen Arzt!

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig **Biofanal**, Vaginaltabletten, angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Sie können die zu wenig angewandten Vaginaltabletten nachträglich am nächsten Morgen anwenden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Zur Erzielung des erwünschten Therapieerfolges halten Sie sich bitte an die im Abschnitt „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“ empfohlene Behandlungsdauer oder an die ärztlich verordnete Anwendungsvorschrift. Die Behandlung sollte nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt unterbrochen oder vorzeitig beendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Biofanal**, Vaginaltabletten, auftreten? Bei überempfindlichen Patientinnen können gelegentlich Brennen und Juckreiz auftreten. In diesen seltenen Fällen ist der Arzt zu unterrichten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese gegebenenfalls spezifisch behandeln kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Blisterfolie aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind **Biofanal**, Vaginaltabletten, aufzubewahren?

Nicht über 30°C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hinweis

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information

November 2000

Patienteninformation zu Biofanal[®], Vaginaltabletten

Liebe Patientin,

mit Biofanal, Vaginaltabletten, haben Sie ein Pfleger-Arzneimittel erhalten, das Ihnen helfen wird, Ihre Hefepilz-Infektion der Scheide wirksam zu behandeln. Halten Sie sich bitte an die empfohlene Dosierung, damit Biofanal, Vaginaltabletten, ihre volle Wirksamkeit entfalten können.

Nystatin ist ein biologischer Wirkstoff, der spezifisch gegen Hefepilze (Candida albicans und andere Candida-Arten) wirkt. Er ist zur Behandlung von Pilzinfektionen der Haut und der Schleimhäute, der Scheide und des Magen-Darm-Kanals geeignet.

Da Nystatin bei vaginaler Anwendung praktisch nicht in die Blutbahn übergeht, ist die Anwendung in der Schwangerschaft möglich. Bei der Behandlung von Pilzinfektionen müssen sämtliche Pilzherde auf der Haut und den Schleimhäuten beseitigt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Anwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, der Sie entsprechend beraten wird.

Ihre Dr. R. Pfleger GmbH wünscht Ihnen gute Besserung.

Biofanal[®], Vaginaltabletten

Hefepilzspezifisches Antimykotikum