

Finamed® 5 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Finasterid

Zur Anwendung bei Männern



mibe GmbH
Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tel.: 034954/247-0
Fax: 034954/247-100

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dasselbe Krankheitsbild haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Finamed 5 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Finamed 5 mg beachten?
3. Wie ist Finamed 5 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Finamed 5 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST FINAMED 5 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Finamed 5 mg gehört zur Gruppe der Testosteron-5 α -Reduktasehemmer. Diese bewirken bei einer Prostatavergrößerung des Mannes eine Verkleinerung der Prostata. Finamed 5 mg wird angewendet zur Behandlung und Kontrolle der gutartigen Vergrößerung der Prostata.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON FINAMED 5 MG BEACHTEN?

Finamed 5 mg darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Finasterid oder einen der sonstigen Bestandteile von Finamed 5 mg sind
- von Frauen
- von Kindern.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Finamed 5 mg ist erforderlich

- bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion.
- bei Patienten mit einem großen Restharnvolumen und/oder stark vermindertem Harnfluss. Diese Patienten sollten sorgfältig von Ihrem Arzt im Hinblick auf eine Harnwegsverengung untersucht werden, bevor sie Finamed 5 mg einnehmen.
- falls Sie einen sogenannten „PSA-Test“ machen müssen, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder die Krankenschwester, da Finasterid die Ergebnisse des Tests beeinflussen kann.
- wenn Ihre Sexualpartnerin schwanger ist oder dies sein könnte, müssen Sie vermeiden, dass Ihre Partnerin Ihrer Samenflüssigkeit ausgesetzt wird, da diese eine geringe Menge des Wirkstoffs enthalten kann.

Auswirkungen bei Fehlgebrauch zu Dopingzwecken

Die Anwendung von Finamed 5 mg kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. Die gesundheitlichen Folgen der Anwendung von Finamed 5 mg als Dopingmittel können nicht abgesehen werden, schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen sind nicht auszuschließen.

Bei Einnahme von Finamed 5 mg mit anderen Arzneimitteln

Deutliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden nicht nachgewiesen.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Finamed 5 mg mit Nahrungsmitteln und Getränken

Finamed 5 mg kann mit oder ohne Speisen eingenommen werden.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Finamed 5 mg

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Finamed 5 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Finamed 5 mg ist nur für die Einnahme durch Männer bestimmt (siehe „Finamed 5 mg darf nicht eingenommen werden“).

Warnung:

Bitte informieren Sie alle schwangeren Frauen in Ihrem Haushalt, dass sie zerstoßene oder zerbrochene Filmtabletten von Finamed 5 mg nicht berühren. Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden könnten, sollten zerstoßene oder zerbrochene Filmtabletten von Finamed 5 mg nicht berühren. Wenn Finasterid von einer Frau, die mit einem männlichen Fetus schwanger ist, über die Haut aufgenommen oder oral eingenommen wird, kann es Missbildungen der äußeren Geschlechtsorgane beim Kind hervorrufen.

Finamed 5 mg Filmtabletten haben einen Filmüberzug, der den Kontakt mit dem aktiven Wirkstoff verhindert, vorausgesetzt, dass die Filmtabletten nicht zerbrochen oder zerstoßen wurden.

Wenn Ihre Sexualpartnerin schwanger ist oder dies sein könnte, müssen Sie vermeiden, dass Ihre Partnerin Ihrer Samenflüssigkeit ausgesetzt wird, da diese eine geringe Menge des Wirkstoffs enthalten kann.

Stillzeit

Finasterid ist nur für die Einnahme durch Männer bestimmt (siehe Abschnitt „Finamed 5 mg darf nicht eingenommen werden“). Es ist unbekannt, ob Finasterid in die Muttermilch übergeht.

