

Doxazosin AbZ

2 mg Tabletten

Wirkstoff: Doxazosin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist *Doxazosin AbZ 2 mg* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* beachten?
3. Wie ist *Doxazosin AbZ 2 mg* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist *Doxazosin AbZ 2 mg* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST *Doxazosin AbZ 2 mg* UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Doxazosin AbZ 2 mg gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln (Alpha-Blocker), die den Blutdruck senken.

Doxazosin AbZ 2 mg wird angewendet zur Behandlung eines hohen Blutdrucks (essentieller Bluthochdruck).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON *Doxazosin AbZ 2 mg* BEACHTEN?

***Doxazosin AbZ 2 mg* darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Doxazosin, andere Chinazoline (z. B. Prazosin, Terazosin) oder einen der sonstigen Bestandteile sind
- wenn Sie stillen

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* ist erforderlich

Informieren Sie vor Beginn der Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* Ihren Arzt über Folgendes:

- wenn Sie an einer Herzerkrankung oder an sonstigen anderen Herzbeschwerden leiden (z. B. Herzmuskelschwäche, Engegefühl im Brustbereich [Angina pectoris] oder Probleme mit den Herzklappen)
- wenn Sie an der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) leiden
- wenn Sie Probleme mit der Leber haben
- wenn Sie eine Diät mit geringem Kochsalzgehalt einhalten (Natrium-arme Diät)
- wenn Sie Wassertabletten einnehmen (siehe auch Abschnitt „Bei Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* mit anderen Arzneimitteln“)
- wenn Sie ein Arzneimittel gegen Erektionsstörungen einnehmen (siehe auch Abschnitt „Bei Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* mit anderen Arzneimitteln“)

Wenn Sie sich aufgrund eines Grauen Stars (Trübung der Augenlinse) einer Augenoperation unterziehen, sollten Sie ihren Augenarzt vor der Operation informieren, dass Sie *Doxazosin AbZ 2 mg* einnehmen oder vorher eingenommen haben. Dies ist notwendig, da *Doxazosin AbZ 2 mg* zu Schwierigkeiten während der Operation führen kann. Durch Ihre Information ist der Augenarzt auf mögliche Komplikationen vorbereitet.

Kinder und Jugendliche

Doxazosin AbZ 2 mg wird nicht für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren empfohlen.

Bei Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Einige Arzneimittel können Wechselwirkungen mit *Doxazosin AbZ 2 mg* verursachen. Dazu gehören:

- Andere Arzneimittel für die Behandlung des Bluthochdrucks (z. B. Wassertabletten)
- Arzneimittel gegen Entzündungen und/oder Schmerzen (so genannte nicht-steroidale Antiphlogistika)
- Arzneimittel, die Blutgefäße erweitern (z. B. Nitrate)
- Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen (z. B. Sildenafil [Viagra®], Tadalafil [Cialis®], Vardenafil [Levitra®])
- Arzneimittel zur Behandlung schwerer Herzprobleme (Dopamin, Ephedrin, Adrenalin, Metaraminol, Methoxamin, Phenylephrin)

Doxazosin kann einige Laborwerte anheben (z. B. Renin, Vanillinmandelsäure). Ihr Arzt sollte dies bei der Bewertung der Ergebnisse wichtiger Labortests berücksichtigen.

Bei Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Doxazosin AbZ 2 mg kann unabhängig von der Nahrungs-/Getränkeaufnahme eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nehmen Sie *Doxazosin AbZ 2 mg* in der Schwangerschaft nur dann ein, wenn es Ihnen nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung von einem Arzt verschrieben wurde.

Sie dürfen *Doxazosin AbZ 2 mg* nicht einnehmen, wenn Sie stillen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie fahren oder Maschinen bedienen. **Seien Sie dabei zu Beginn der Behandlung besonders vorsichtig.** Es kann sein, dass Sie sich schwach oder benommen/schwindelig fühlen. Wenn Sie diese Nebenwirkung an sich bemerken, setzen Sie sich nicht ans Steuer und bedienen Sie keine Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von *Doxazosin AbZ 2 mg*

Doxazosin AbZ 2 mg enthält Lactose. Bitte nehmen Sie *Doxazosin AbZ 2 mg* daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST *Doxazosin AbZ 2 mg* EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie *Doxazosin AbZ 2 mg* immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

- Die **Anfangsdosis** ist ½ Tablette (1 mg Doxazosin) einmal täglich. Je nachdem, ob sich Ihr Zustand nach 1–2 Wochen bessert, kann Ihr Arzt entscheiden, die Dosis auf 1 Tablette (2 mg Doxazosin) einmal täglich und später auf 2 Tabletten (4 mg Doxazosin) einmal täglich zu erhöhen. Falls erforderlich kann Ihr Arzt die Dosis schließlich auf 4 Tabletten (8 mg Doxazosin) einmal täglich steigern.
- Für die **langfristige Behandlung** wird täglich einmal eine Dosis zwischen 1 und 2 Tabletten (2–4 mg Doxazosin) empfohlen. Die höchstmögliche Tagesdosis beträgt 16 mg Doxazosin.

Art der Anwendung

- *Doxazosin AbZ 2 mg* sind Tabletten zum Einnehmen
- Bitte nehmen Sie die Tabletten morgens unabhängig von der Mahlzeit mit viel Flüssigkeit ein (z. B. ein Glas Wasser)
- Nehmen Sie die ganze Dosis immer auf einmal und nicht über den Tag verteilt ein

Dauer der Anwendung

Nehmen Sie das Arzneimittel so lange ein, wie Ihr Arzt Ihnen sagt.

Wenn Sie eine größere Menge von *Doxazosin AbZ 2 mg* eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie zu viele Tabletten einnehmen, sind die häufigsten Symptome, dass Sie sich schwindelig oder benommen fühlen, weil Ihr Blutdruck absinkt. Legen Sie sich auf den Rücken und lagern Sie die Füße so, dass sie höher liegen als Ihr Kopf. Setzen Sie sich **unverzüglich** mit der nächsten Notfallambulanz eines Krankenhauses in Verbindung oder informieren Sie Ihren Arzt oder

Apotheker. Nehmen Sie diese Gebrauchsinformation und übrig gebliebene Tabletten mit, damit der Arzt weiß, was Sie eingenommen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Doxazosin AbZ 2 mg vergessen haben

Versuchen Sie, Ihre Tabletten täglich wie verordnet einzunehmen. Sollten Sie jedoch eine Dosis vergessen, nehmen Sie sie einfach ein, sobald Sie daran denken. **Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.**

Wenn Sie die Einnahme von Doxazosin AbZ 2 mg abbrechen

Beenden Sie die Einnahme Ihres Arzneimittels nicht, ohne Ihren Arzt zu befragen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Doxazosin AbZ 2 mg* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Beenden Sie die Einnahme dieses Arzneimittels und suchen Sie sofort einen Arzt oder die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses auf, wenn die folgenden Beschwerden bei Ihnen auftreten:

- Allergische Reaktionen wie keuchende Atmung, Atemnot, sehr starker Schwindel oder Zusammenbruch, Anschwellung im Gesichts- oder Rachenbereich, umfangreicher Hautausschlag mit roten Flecken oder Bläschen.
- Brustschmerzen, beschleunigter oder unregelmäßiger Herzschlag, Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Gelbfärbung der Haut oder des Augapfels verursacht durch Leberprobleme
- Ungewöhnliche Blutergüsse oder Blutungen verursacht durch eine verminderte Anzahl von Blutplättchen

Zu Beginn der Behandlung können Sie sich möglicherweise benommen oder schwindelig fühlen. Dies kann insbesondere dann passieren, wenn Sie aus dem Liegen aufstehen. Aus diesem Grund kann es sein, dass Ihr Arzt Sie zu Beginn der Behandlung eng überwacht.

Häufig (weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten)

- Teilnahmslosigkeit
- Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit
- Sehstörungen
- Beschleunigter Herzschlag, Brustschmerzen
- Schwindel, Wassereinlagerungen im Gewebe (Ödeme), lagebedingter Schwindel, Benommenheit/Schwindel beim Aufstehen aus einer liegenden Position
- Kurzatmigkeit, Anschwellen der Nasenschleimhaut
- Verstopfung, Verdauungsstörungen, Übelkeit
- Muskelkrämpfe, Schwächegefühl
- Häufiger Harndrang, vermehrtes Wasserlassen
- Verzögerung der Ejakulation

Gelegentlich (weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten)

- Durst, niedrige Kaliumkonzentrationen im Blut, Gicht, gestörtes Geschmackempfinden
- Alpträume, Gedächtnisverlust, seelische Instabilität
- Veränderter Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit
- Klingeln in den Ohren (Tinnitus)
- unregelmäßiger Herzschlag, Engegefühl im Brustbereich (Angina pectoris), Herzrasen, Herzinfarkt
- erniedrigter Blutdruck, periphere Kreislaufstörungen, Ohnmachtsanfälle (insbesondere zu Beginn der Behandlung, unter sehr hohen Dosen oder wenn die Behandlung nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen wird).
- Nasenbluten, Atembeschwerden (keuchen), Husten, Rachenentzündung
- Appetitlosigkeit, vermehrter Appetit, Mundtrockenheit
- Gelbsucht, erhöhte Leberenzymwerte
- Haarausfall, Gesichts-/allgemeine Schwellungen (durch Wassereinlagerungen)
- Muskelschmerzen, Gelenkschwellungen/-schmerzen, Muskelschwäche, Muskelsteifigkeit, Zittern
- Ungewollter Abgang von Urin, Störungen im Bereich der Harnwege, Störungen beim Wasserlassen
- Plötzliche Hautrötung im Gesicht, Fieber/Schüttelfrost, Blässe

Selten (weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten)

- Absinken des Blutzuckerspiegels
- Depression, Erregung
- Taubheitsgefühl
- Verschwommenes Sehen
- Störung der Blutversorgung des Gehirns
- Anschwellen des Kehlkopfes
- Magenschmerzen, Durchfall, Erbrechen
- Allergischer Hautausschlag, Juckreiz, Hautblutungen
- Impotenz, Dauer-Erektion
- Bei älteren Menschen Absinken der Körpertemperatur

Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 Behandelten)

- Verminderte Anzahl von weißen und roten Blutkörperchen sowie von Blutplättchen
- Schnupfen
- Leberentzündung, Gallestauung (es kommt keine oder nicht genug Galle im Darm an)
- Anstieg bestimmter Laborwerte (Harnstoff, Kreatinin)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Wenn Sie sich einer Augenoperation bei Grauem Star (Katarakt-Operation) unterziehen müssen und *Doxazosin AbZ 2 mg* einnehmen oder früher eingenommen haben, kann es während der Augenoperation zu Schwierigkeiten kommen (siehe 2. unter „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von *Doxazosin AbZ 2 mg* ist erforderlich“).

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST Doxazosin AbZ 2 mg AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nicht über 30 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Doxazosin AbZ 2 mg enthält

Der Wirkstoff ist Doxazosin.

Jede Tablette enthält 2 mg Doxazosin als Doxazosinmesylat.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, Lactose, Natriumstärkeglykolat Typ A, Hochdisperses Siliciumdioxid, Natriumlaurylsulfat, Magnesiumstearat.

Wie Doxazosin AbZ 2 mg aussieht und Inhalt der Packung

Weiß, längliche Tablette mit einer Bruchkerbe.

Packungen mit 20, 50 und 100 Tabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer

AbZ-Pharma GmbH

Dr.-Georg-Spohn-Str. 7

89143 Blaubeuren

Hersteller

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

89143 Blaubeuren

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

August 2010

AbZ-Pharma wünscht Ihnen gute Besserung!
