

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Rutinion® FT 100 mg



Wirkstoff: Rutosid x 3H₂O

Tabletten zum Einnehmen

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 mg Rutosid x 3H₂O

Sonstige Bestandteile:

Maisstärke, Hochdisperses Siliciumdioxid, Carmellose-Calcium, Talkum, Magnesiumstearat (Ph. Eur.)

Enthält Kohlenhydrate, entsprechend weniger als 0,1 BE pro Einzeldosis.

Darreichungsform und Packungsgrößen

Originalpackung mit 100 Tabletten (N3)

Bündelpackung mit 200 (2 x 100) Tabletten

Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

biomo pharma GmbH, Josef-Dietzgen-Str. 3, 53773 Hennef

Tel.: 0 22 42 - 8 74 00, Fax.: 0 22 42 - 8 74 04 99

Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur Besserung von Beinbeschwerden, wie Schweregefühl bei müden Beinen.

Bei neu oder plötzlich auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bläulicher Verfärbung der Beine ist sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Gegenanzeigen

Rutinion FT 100 mg sollte nicht angewendet werden bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.



Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit:

Rutinion FT 100 mg ist im ersten Trimenon der Schwangerschaft kontraindiziert.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei Einhaltung der Dosieranleitung müssen keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Wechselwirkungen sind keine bekannt.

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Rutinion FT 100 mg nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften.

Wie und wie oft sollten Sie Rutinion FT 100 mg anwenden?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird eine Dosierung von 3 x 1 bis 2 Tabletten täglich empfohlen. Tabletten während der Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Wie lange sollten Sie Rutinion FT 100 mg anwenden?

Beachten Sie bitte den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Nebenwirkungen

Im Wesentlichen sind keine Nebenwirkungen bekannt. Allgemein werden für Rutosid in sehr seltenen Fällen allergische Hautreaktionen, Magen-Darm-Störungen, Flush (Gesichtsröte) oder Kopfschmerzen berichtet, die nach Absetzen des Präparates rasch abklingen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Nebenwirkungen auftreten ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit von Rutinion FT 100 mg

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf Blister und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sollten Sie Rutinion FT 100 mg aufbewahren?

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information

Oktober 2004

pal - b15 - 10/04 - 02

