



Cefazink® 20 mg

Filmdabletten

Wirkstoff: Zink-D-gluconat, entsprechend 20 mg Zink

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern

Apothekenpflichtig

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Cefazink® 20 mg, Filmdabletten, jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Cefazink® 20 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefazink® 20 mg beachten?
3. Wie ist Cefazink® 20 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefazink® 20 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Cefazink® 20 mg und wofür wird es angewendet?

Cefazink® 20 mg ist ein Mineralstoffpräparat.

Anwendungsgebiete:

- Nachgewiesener Zinkmangel.
- Therapie mit Penicillamin und anderen Komplexbildnern.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Cefazink® 20 mg beachten?

Cefazink® 20 mg darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zink-D-gluconat oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Cefazink® 20 mg ist erforderlich:

Bei längerfristiger Anwendung von Zink sollte neben Zink auch Kupfer labordiagnostisch überwacht werden.

Bei Einnahme von Cefazink® 20 mg mit anderen Arzneimitteln:

Bei gleichzeitiger Gabe von Zink und Eisensalzen bzw. Kupfersalzen kann die Aufnahme von Zink in den Blutkreislauf vermindert werden. Zink kann die Verfügbarkeit von Kupfer beeinträchtigen. Die Wirksamkeit von Antibiotika wie Tetrazyklin, Ciprofloxacin und Chinolonen wird bei gleichzeitiger Einnahme von Zink vermindert. Die Gabe von Komplexbildnern wie D-Penicillamin, Dimercaptopropansulfonsäure (DMPS) oder Edetinsäure (EDTA) kann die Aufnahme von Zink vermindern oder die Ausscheidung erhöhen.

Zwischen der Einnahme von Cefazink® 20 mg und der Einnahme dieser Präparate sollte deshalb ein Abstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Cefazink® 20 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an Phytinen (z.B. Ge-

treideprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse) reduzieren die Zinkresorption. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Kaffee die Resorption von Zink beeinträchtigt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei einer vorschriftsmäßigen Anwendung besteht im empfohlenen Dosisbereich keine Einschränkung bei der Einnahme von Cefazink® 20 mg in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen: Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Cefazink® 20 mg:

Cefazink® 20 mg ist glutenfrei und enthält keine verwertbaren Kohlenhydrate (0 BE).

3. Wie ist Cefazink® 20 mg einzunehmen?

Nehmen Sie Cefazink® 20 mg immer genau nach den Anweisungen in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

- Bei nachgewiesenem Zinkmangel:
1 Filmdablette täglich.
- Bei Therapie mit Penicillamin und anderen Komplexbildnern:
1 Filmdablette täglich.

Art der Anwendung:

Wie sollten Sie Cefazink® 20 mg einnehmen?

Nehmen Sie die Filmdabletten mit ausreichend Flüssigkeit mit deutlichem zeitlichem Abstand vor den Mahlzeiten ein, da die Aufnahme von Zink in den Blutkreislauf durch Nahrungsmittel gestört sein kann.

Dauer der Anwendung:

Wie lange sollten Sie Cefazink® 20 mg einnehmen?

Die Anwendungsdauer richtet sich nach Bedarf und Behandlungserfolg.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn

Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Cefazink® 20 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Cefazink® 20 mg eingenommen haben, als Sie sollten:

Anzeichen einer Überdosierung sind Metallgeschmack auf der Zunge, Kopfschmerzen, Diarrhoe und Erbrechen. Beenden Sie in diesem Fall die Einnahme von Cefazink® 20 mg und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Wenn Sie die Einnahme von Cefazink® 20 mg vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Cefazink® 20 mg abbrechen:

Das Absetzen von Cefazink® 20 mg ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Cefazink® 20 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Bisher wurden bei der Einnahme von Cefazink® 20 mg keine Nebenwirkungen beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist Cefazink® 20 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen auf der Faltschachtel und auf der Durchdrückpackung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. Weitere Informationen

Was Cefazink® 20 mg (Filmtabletten) enthalten:

Der Wirkstoff ist:

1 Filmtablette enthält:

140 mg Zink-D-gluconat

(entsprechend 20 mg Zink)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Mikrokristalline Cellulose, Croscarmellose-Natrium, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Hypromellose, Ethylcellulose, Triethylcitrat.

Wie Cefazink® 20 mg aussieht und Inhalt der Packung:

Eigenschaften: Bikonvexe, runde Tabletten ohne Bruchrinne.

Inhalt: Originalpackungen mit 20 bzw. 50 bzw. 100 Filmtabletten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG

Postfach 1360

D-87403 Kempten

Telefon: 0831/57401-0

Telefax: 0831/57401-50

e-mail: cefak@cefak.com

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet: 03/2010