


Gel 100 mg/g**Bei Akne vulgaris**

- Basistherapie für alle Akneformen
- besonders hautverträgliche wäßrige Gelgrundlage
- Schältherapie für normale und unempfindliche Haut
- physiologischer Haut-pH-Wert (5,5)
- frei von Duft- und Konservierungsstoffen

Wirkstoff: Benzoylperoxid

Zusammensetzung: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 g Akneroxid Gel 50 mg/g enthalten: Benzoylperoxid 50 g. 100 g Akneroxid Gel 100 mg/g enthalten: Benzoylperoxid 100 g. Sonstige Bestandteile: ger. Wasser; Lauralkohol; Carbomer; Natriumhydroxid; Edetinsäure.

Anwendungsgebiete: Akneroxid Gel 50 mg/g: Akne vulgaris; Akneroxid Gel 100 mg/g: Akne vulgaris, insbesondere an Brust und Rücken. Ferner Akne vulgaris, die auf 5%ige Benzoylperoxidzubereitung nicht ausreichend anspricht.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Benzoylperoxid oder einen der übrigen Inhaltsstoffe. Eine Anwendung auf verletzter Haut sollte nicht erfolgen. Akneroxid Gel nicht mit den Augen in Berührung bringen, nicht in die Schleimhäute, der Mund-, Nasen- und Augenwinkel, sowie bei trockener und seborrhöischer Haut auftragen. Während Schwangerschaft/Stillzeit nur nach sorgfältiger Beratung mit dem Arzt anwenden. Im letzten Monat der Schwangerschaft sollte Akneroxid Gel nicht angewendet werden. Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach externer Behandlung in der Stillzeit liegen nicht vor.

Nebenwirkungen: In seltenen Fällen Kontaktallergie. Der Wirkungseintritt kann in den ersten Tagen vor dem Auftreten von Spannungsgefühl und leichter Rötung der Haut begleitet sein. Das bei empfindlicher Haut anfangs leichte Brennen vergeht normalerweise im Laufe der Behandlung. Mäßiges Schälchen bleibt während gesamter Therapiedauer bestehen. Falls übermäßige Rötung und Brennen länger als 5 Tage anhalten, ist das Medikament abzusetzen. Nach Abklingen dieser Erscheinungen kann die Behandlung oft mit weniger häufigem Auftragen bzw. mit der 5%igen anfanglichen Zubereitung fortgesetzt werden. Gelegentlich stärkere Austrocknung der Haut.

Besondere Hinweise: Nicht an Augenbrauen, im Bartbereich oder an der Stirnhaargrenze anwenden. Nicht mit sauren oder alkalischen Textilien in Berührung bringen. Intensive UV-Bestrahlung (Sonnenbestrahlung/Solarien) vermeiden. Verfallsdatum beachten. Nicht über 25°C lagern.