

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zinksalbe Lichtenstein

Wirkstoff: Zinkoxid

ZUSAMMENSETZUNG:

100 g Salbe enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Zinkoxid 10 g.

Sonstige Bestandteile: Wollwachsalkoholsalbe.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Salbe

Zum Auftragen auf die Haut

Tuben mit 40 g [N1] und 100 g [N2] Salbe

Wundsalbe

Pharmazeutischer Unternehmer

Winthrop Arzneimittel GmbH

Industriestraße 10

82256 Fürstenfeldbruck

Tel.: 0 81 41/35 72-0

Fax: 0 81 41/35 72-5 99

Hergestellt von:

C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG, Frühlingsstraße 7, 83620 Feldkirchen-Westerham

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Unterstützung einer Therapie von subakuten und chronischen Ekzemen; Wundsein der Haut durch Scheuern oder Feuchtigkeit; Windeldermatitis; Fissuren (Hautrisse).

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Zinksalbe Lichtenstein nicht anwenden?

Überempfindlichkeit gegenüber Wollwachsalkoholen.

WECHSELWIRKUNGEN

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Zinksalbe Lichtenstein oder werden in ihrer Wirkung von Zinksalbe Lichtenstein beeinflusst?

Vor Anwendung anderer Externa (äußerlich anzuwendende Arzneimittel) ist Zinksalbe Lichtenstein vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Zinksalbe Lichtenstein nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Zinksalbe Lichtenstein sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und wie sollten Sie Zinksalbe Lichtenstein anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, wird Zinksalbe Lichtenstein ein- bis mehrmals täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und mit Mull abgedeckt.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Zinksalbe Lichtenstein auftreten?

Nach Auftragen von Zinksalbe Lichtenstein auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Gelegentlich kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen der Haut kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Tube und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Zinksalbe Lichtenstein aufzubewahren?

Nicht über +25 °C aufbewahren. Vor starken Temperaturschwankungen schützen.

Stand der Information:

Januar 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig