



Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

CALCIUM FLUORATUM

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung

1 Tablette (265 mg) enthält je nach der auf Etikett und Faltschachtel angegebenen Potenz (Verdünnung)

arzneilich wirksame/n Bestandteil/e:

Calcium fluoratum Trit. D 3 250 mg;

Calcium fluoratum Trit. D 6 250 mg;

Calcium fluoratum Trit. D 12 250 mg;

sonstige Bestandteile: (Arzneiträger Lactosemonohydrat),
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Enthält Lactose. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

10 g Salbe (= 11,5 ml) enthalten

arzneilich wirksame/n Bestandteil/e:

Calcium fluoratum Trit. D 6 100 mg;

sonstige Bestandteile: (Arzneiträger Lactosemonohydrat),
Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Macrogol-20-glycerol-
monostearat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykol, weißes
Vaseline, Wasser, gereinigt.

Enthält Lactose. Vorsichtsmaßnahmen beachten.



1105 / 14 142.002

Darreichungsform und Inhalt

Tabletten zum Einnehmen (Lutschen)

Calcium fluoratum D 3

Jeweils in Gläsern mit 80 und 200 Tabletten.

Calcium fluoratum D 6

Calcium fluoratum D 12

Jeweils in Gläsern mit 80, 200 und 500 Tabletten.

Creme zur Anwendung auf der Haut

Calcium fluoratum D 6

Tube mit 100 ml Creme (ab Frühjahr 2006)

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller

Bombastus-Werke AG

Wilsdruffer Straße 170, D-01705 Freital

Tel. 0351/65803-0, Fax: 0351/65803-99

e-mail: info@bombastus-werke.de

Internet: www.bombastus.de

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie die Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Hinweis für Diabetiker: Die Tabletten enthalten Milchzucker. Eine gesonderte Berücksichtigung der Kohlenhydratmenge ist für Diabetiker nicht erforderlich.

Hinweis für Zöliakie-Kranke: Dieses Arzneimittel ist glutenfrei.
Arzneimittel - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dosieranleitung, Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, (in D3 höchstens 6mal täglich), je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3mal täglich je eine Tablette einnehmen.

Salben werden 1 - 2mal täglich auf die entsprechenden Hautbereiche aufgetragen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Verfalldatum.

Tabletten sind nach Anbruch 24 Monate verwendbar.

Salben sind nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Stand der Information

November 2005