

Alfuzosin HEXAL® 10 mg Retardtabletten

Wirkstoff: Alfuzosinhydrochlorid

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Alfuzosin HEXAL 10 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg beachten?
3. Wie ist Alfuzosin HEXAL 10 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Alfuzosin HEXAL 10 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen



1 Was ist Alfuzosin HEXAL 10 mg und wofür wird es angewendet?

Alfuzosin HEXAL 10 mg gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln (Alpha₁-Rezeptorenblocker), die bei gutartiger Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostata) beschwerdelindernd wirken.

Alfuzosin HEXAL 10 mg wird angewendet

- zur Behandlung der Beschwerden (funktionelle Symptome) bei gutartiger Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostata)
- bei akutem Harnverhalt aufgrund einer gutartigen Vergrößerung der Prostata, siehe Abschnitt 3

2 Was müssen Sie vor der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg beachten?

Alfuzosin HEXAL 10 mg darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Alfuzosin oder einen der sonstigen Bestandteile von Alfuzosin HEXAL 10 mg sind.
- wenn Sie gleichzeitig andere Arzneimittel mit der gleichen Wirkungsweise (Alpha₁-Rezeptorenblocker) oder Dopamin-Rezeptoragonisten (wie z.B. bestimmte Antiparkinsonmittel) einnehmen.
- wenn Ihre Leberfunktion eingeschränkt ist.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg ist erforderlich

- wenn Sie gleichzeitig zur gutartigen Vergrößerung der Prostata unter einer Stauung der oberen Harnwege, einem chronischen Harnwegsinfekt oder Blasensteinen leiden. In diesem Fall sollten Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg nicht einnehmen.
- wenn Sie an einer schweren Nierenfunktionsstörung leiden, da nur begrenzte Erfahrungen mit diesem Krankheitsbild vorliegen.
- wenn Sie älter als 65 Jahre sind.
- wenn bei Ihnen eine Überlaufblase, ein Harnverhalt oder ein fortgeschrittenes Nierenversagen aufgrund einer Blasenhalshalverengung vorliegt. In diesem Fall sollten Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg nicht einnehmen.
- wenn es in den ersten Stunden nach der Einnahme zu einem Blutdruckabfall bei einem Lagewechsel (z.B. beim Aufstehen) kommt, insbesondere wenn Sie zusätzlich blutdrucksenkende Arzneimittel erhalten. Dieser Blutdruckabfall kann mit Symptomen wie Schwindel, Müdigkeit und Schwitzen einhergehen. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Blutdruck fällt, legen Sie sich hin und lagern Sie die Füße und Beine hoch, bis die Symptome abgeklungen sind. Diese Symptome halten gewöhnlich nur kurz an und treten zu Beginn der Behandlung auf. Die Behandlung muss in der Regel nicht abgebrochen werden.
- wenn Sie Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck einnehmen. Ihr Arzt wird Ihren Blutdruck insbesondere zu Beginn der Behandlung in diesem Fall regelmäßig kontrollieren.
- wenn bei Ihnen häufig Anzeichen von Blutdruckabfall bei Lagewechsel, z.B. vom Liegen zum Stehen, vorkommen (symptomatische orthostatische Hypotonie), ist Alfuzosin HEXAL 10 mg mit Vorsicht zu verabreichen.
- wenn es bei Ihnen in der Vergangenheit nach Einnahme eines anderen Alpha-Blockers zu einem ausgeprägten Blutdruckabfall gekommen ist. In diesem Fall muss die Behandlung mit Alfuzosin HEXAL 10 mg mit Vorsicht erfolgen.
- wenn Sie unter einer akuten Herzleistungsschwäche oder Flüssigkeitsansammlung in den Lungen (Lungenödem) durch Herzklappenverengung im linken Herzen leiden.

Wenn Sie unter Verengung der Herzkranzgefäße leiden, sollte die begonnene Behandlung dieser Erkrankung fortgeführt werden. Bei Wiederauftreten oder Verschlimmerung der Symptome einer Verengung der Herzkranzgefäße, z.B. Brustschmerzen (Angina pectoris), sollte Alfuzosin HEXAL 10 mg abgesetzt werden.

Nehmen Sie die Tablette im Ganzen ein. Sie dürfen die Tablette vor der Einnahme nicht zerstoßen, zermahlen oder zerkauen, da dadurch eine zu große Menge des Wirkstoffs zu schnell in Ihren Körper gelangt und es verstärkt zu Nebenwirkungen kommen kann.

Wenn Sie sich aufgrund eines grauen Stars (Katarakts) einer Augenoperation unterziehen, sollten Sie Ihren Augenarzt informieren, dass Sie dieses Medikament einnehmen oder vorher eingenommen haben. Dies ist notwendig, da es bei einigen Patienten, die gleichzeitig oder vorher mit Alfuzosin HEXAL 10 mg behandelt wurden, zu Schwierigkeiten bei der Operation (z.B. Pupille nur unzureichend erweitert, Regenbogenhaut [Iris] während des Eingriffes erschlafft) gekommen ist. Der Augenarzt kann dann angemessene Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf die Medikation und die angewandte Operationstechnik ergreifen. Fragen Sie bitte Ihren Arzt, ob Sie die Einnahme Ihrer Medikation wegen der Katarakt-Operation verschieben oder vorübergehend unterbrechen sollen.

Bei Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Sie dürfen Alfuzosin HEXAL 10 mg nicht zusammen mit gefäßerweiternden Arzneimitteln wie Alpha₁-Rezeptorenblockern (z.B. Tamsulosin, Terazosin, Doxazosin) und Dopamin-Rezeptoragonisten einnehmen, da die Wirkung von Alfuzosin HEXAL 10 mg verstärkt werden kann.

Andere Arzneimittel können die Wirkung von Alfuzosin HEXAL 10 mg und Alfuzosin HEXAL 10 mg kann die Wirkung anderer Arzneimittel beeinträchtigen. Zu diesen Arzneimitteln zählen:

- Ketoconazol und Itraconazol (Mittel zur Behandlung von Pilzinfektionen)
- Ritonavir (Mittel zur Behandlung der HIV-Infektion)
- Mittel zur Senkung von Bluthochdruck (siehe „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg ist erforderlich“)
- Mittel, die zur Behandlung von Engegefühl und Schmerzen in der Brust (Angina pectoris) eingesetzt werden (so genannte Nitrate) (siehe „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg ist erforderlich“)
- Arzneimittel, die Sie vor einer Operation erhalten (Narkosemittel). Ihr Blutdruck kann stark abfallen. Wenn Sie sich einer Operation unterziehen müssen, informieren Sie den behandelnden Arzt, dass Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg einnehmen. 24 Stunden vor einer Operation muss Alfuzosin HEXAL 10 mg abgesetzt werden.

Bei Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Alfuzosin HEXAL 10 mg sollte nach einer Mahlzeit eingenommen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aufgrund des Anwendungsgebietes trifft dieser Abschnitt nicht zu.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Zu Beginn der Behandlung mit Alfuzosin HEXAL 10 mg können Sie sich benommen oder schwach fühlen und Ihnen kann schwindlig werden. Warten Sie deshalb ab, wie Sie auf Alfuzosin HEXAL 10 mg reagieren, bevor Sie Auto fahren, Maschinen bedienen oder andere gefährliche Tätigkeiten ausüben. Dies gilt insbesondere bei gleichzeitigem Alkoholkonsum.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Alfuzosin HEXAL 10 mg

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3 Wie ist Alfuzosin HEXAL 10 mg einzunehmen?

Nehmen Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Behandlung der gutartigen Vergrößerung der Prostata
Nehmen Sie 1 Retardtablette Alfuzosin HEXAL 10 mg pro Tag ein. Alfuzosin HEXAL 10 mg ist für die Langzeitbehandlung geeignet.

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Akuter Harnverhalt

Im Falle eines akuten Harnverhalts aufgrund der Vergrößerung der Prostata nehmen Sie ab dem 1. Tag der Katheterisierung 1 Retardtablette Alfuzosin HEXAL 10 mg pro Tag ein. Die Behandlung des akuten Harnverhalts mit Alfuzosin HEXAL 10 mg wird üblicherweise bis einen Tag nach Entfernen des Katheters fortgesetzt.

Hinweis: Diese Anwendung zur begleitenden Therapie eines akuten Harnverhalts gilt im Allgemeinen für Patienten ab einem Alter von 65 Jahren.

Art der Anwendung

Nehmen Sie Alfuzosin HEXAL 10 mg nach einer Mahlzeit mit ausreichend Flüssigkeit ein. Die Retardtablette darf auf keinen Fall zerkaut oder zerteilt werden, da dies die schrittweise Freisetzung des Wirkstoffes beeinflussen würde.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Alfuzosin HEXAL 10 mg zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Alfuzosin HEXAL 10 mg eingenommen haben als Sie sollten

Wenn Sie große Mengen von Alfuzosin HEXAL 10 mg einnehmen, kann Ihr Blutdruck plötzlich stark abfallen. Ihnen kann schwindlig werden oder Sie können sogar ohnmächtig werden. Wenn Sie bemerken, dass Ihnen schwindlig wird, setzen oder legen Sie sich hin, bis Sie sich besser fühlen. Wenn sich Ihr Zustand nicht bessert, informieren Sie Ihren Arzt, da eine Behandlung im Krankenhaus notwendig sein kann.

Wenn Sie die Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg vergessen haben

Nehmen Sie auf keinen Fall die doppelte Dosis bei der nächsten Einnahme! Zum nächsten üblichen Einnahmetermin nehmen Sie bitte nur eine Retardtablette wie von Ihrem Arzt verordnet ein und holen Sie die Einnahme nicht nach.

Wenn Sie die Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg abbrechen

Bitte unterrichten Sie Ihren Arzt von jeder Behandlungsunterbrechung oder von Ihrem Wunsch, die Behandlung zu beenden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Alfuzosin HEXAL 10 mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig:

Schwindel/Benommenheit, Ohnmachtsgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Schwächegefühl

Gelegentlich:

Schläfrigkeit, Schwindel, Unwohlsein, Sehstörungen (gestörtes Sehvermögen), Blutdruckabfall bei Lagewechsel, vorübergehende Ohnmacht, Herzrasen, Herzklopfen, Schnupfen, Hautausschlag, Juckreiz, Harninkontinenz, Hitzewallungen, Ödeme (Wasseransammlung im Körper), Brustschmerzen, Mundtrockenheit, Durchfall, Erbrechen

Bei Blutdruckabfall bzw. Blutdruckabfall bei Lagewechsel können Beschwerden wie Schwindel, Schwächegefühl, Müdigkeit, Benommenheit oder Schweißausbruch bis zur vorübergehenden Ohnmacht auftreten. Bei allen Beschwerden sollten Sie sich sofort hinlegen und die Beine hoch lagern, bis die Beschwerden verschwunden sind. In schweren Fällen informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt.

Sehr selten:

Nesselsucht (Urtikaria), Schwellung von Weichteilgewebe (Angioödem)

In sehr seltenen Fällen kann es zu einem erstmaligen Auftreten, zu einer Verschlechterung oder einem Wiederauftreten einer Angina pectoris bei Patienten mit vorbestehender Erkrankung der Herzkranzgefäße kommen (siehe Abschnitt 2 „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg ist erforderlich“).

Nebenwirkungen, deren Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar sind:

Leberzellschädigungen, Lebererkrankungen aufgrund einer Gallenstauung

Wenn Sie sich einer Augenoperation bei grauem Star (Katarakt-Operation) unterziehen müssen und Alfuzosin HEXAL 10 mg einnehmen oder früher eingenommen haben, kann es während der Operation zu Schwierigkeiten kommen (siehe Abschnitt 2 „Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Alfuzosin HEXAL 10 mg ist erforderlich“).

Bei allen Alphablockern besteht generell bei der Anwendung die Möglichkeit des Auftretens einer Dauererktion (Priapismus), welche daher nicht ausgeschlossen werden kann, obgleich für Alfuzosin nur Berichte von Einzelfällen vorliegen.

Sollten Sie eine oder mehrere der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, damit er über die gegebenenfalls erforderlichen weiteren Maßnahmen entscheiden kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5 Wie ist Alfuzosin HEXAL 10 mg aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen

Nicht über 30 °C lagern.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6 Weitere Informationen

Was Alfuzosin HEXAL 10 mg enthält

Der Wirkstoff ist Alfuzosinhydrochlorid.

1 Retardtablette enthält 10 mg Alfuzosinhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind: Hypromellose, Lactose-Monohydrat, Povidon K25, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich].

Wie Alfuzosin HEXAL 10 mg aussieht und Inhalt der Packung

Alfuzosin HEXAL 10 mg sind weiße, runde Retardtabletten mit abgeschrägten Kanten.

Alfuzosin HEXAL 10 mg ist in Packungen mit 30, 50 und 100 Retardtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

HEXAL AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: service@hexal.com



Hersteller

Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2010.

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

46061832