

Zur diätetischen Behandlung der Migräne.

Gezielt zur Unterstützung des Energiestoffwechsels und des Nervensystems. Die gezielte Kombination ausgewählter Mikronährstoffe in Migravent® ist auf den besonderen Bedarf von Personen mit Migräne abgestimmt. Magnesium und Riboflavin (Vitamin B2) tragen zur normalen Funktion des Energiestoffwechsels und des Nervensystems bei.



Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung der Migräne. Aufgrund des erhöhten Bedarfs in dem besonderen Anwendungsbereich sind Magnesium, Vitamine und alle weiteren Mineralstoffe erhöht. Bei Migravent® handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät.

Inhaltsstoffe

Nährwertangaben	pro 2 Kapseln	pro 4 Kapseln	pro 100 g
Vitamin A (RE*)	375 µg	750 µg	28000 µg
Vitamin C	100 mg	200 mg	7500 mg
Vitamin E (alpha-TE**)	67 mg	134 mg	5000 mg
Thiamin	2,5 mg	5,0 mg	190 mg
Riboflavin	200 mg	400 mg	15000 mg
Niacin (NE***)	10 mg	20 mg	750 mg
Vitamin B6	2,5 mg	5,0 mg	190 mg
Vitamin B12	3,0 µg	6,0 µg	220 µg
Folsäure	200 µg	400 µg	14900 µg
Vitamin D	2,5 µg	5,0 µg	190 µg
Pantothensäure	5,0 mg	10 mg	370 mg
Biotin	83 µg	165 µg	6200 µg
Magnesium	300 mg	600 mg	22400 mg
Eisen	0,4 mg	0,8 mg	30 mg
Zink	2,5 mg	5,0 mg	190 mg
Mangan	1000 µg	2000 µg	75000 µg
Kupfer	0,25 mg	0,5 mg	19 mg
Chrom	15 µg	30 µg	1100 µg
Molybdän	30 µg	60 µg	2200 µg
Selen	25 µg	50 µg	1900 µg
Coenzym Q10	75 mg	150 mg	5600 mg
Bioflavonoide	2,5 mg	5,0 mg	190 mg
Brennwert	4 kJ/1 kcal	7 kJ/2 kcal	272 kJ/64 kcal
Eiweiß	0,2 g	0,4 g	14,5 g
Kohlenhydrate	0,02 g	0,04 g	1,50 g
Fett	0 g	0 g	0 g

* Retinoläquivalente

** Tocopheroläquivalente

***Niacinäquivalente

Gebrauchsempfehlung:

2 x täglich 1-2 Kapseln morgens und abends zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.

Wichtige Hinweise:

Bei Migravent® handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Die Anwendung sollte gemäß der Gebrauchsempfehlung täglich über einige Monate erfolgen. Während der Anwendung von Migravent® sollten Sie keine anderen magnesium- oder riboflavin-haltigen Produkte einnehmen. Schwangere und Kinder sollten die Anwendung mit ihrem Arzt abstimmen. Riboflavin ruft eine unbedenkliche gelbliche Färbung des Urins hervor. Breiige Stühle und Völlegefühl können auftreten. Wie alle magnesiumhaltigen Präparate sollte Migravent® bei gestörter Nierenfunktion nicht angewendet werden. Im Hinblick auf mögliche Resorptionsbeeinträchtigungen sollte generell ein Abstand von 1 - 2 Stunden zwischen der Einnahme von Migravent® und Arzneimitteln mit den folgenden Wirkstoffen eingehalten werden: Tetracycline, eisenhaltige Verbindungen, Natriumfluorid, Isoniazid, Chlorpromazin und Digoxin. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.

Erhältliche Packungsgröße:

90 Kapseln UVP 25,95 €

Exklusiv in der Apotheke