



Clabin[®]
plus



Lösung zur Anwendung auf der Haut
Wirkstoffe: Salicylsäure, Milchsäure



Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Clabin[®] plus jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 1-2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Clabin[®] plus und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin[®] plus beachten?
3. Wie ist Clabin[®] plus anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Clabin[®] plus aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Clabin[®] plus und wofür wird es angewendet?

Clabin[®] plus ist ein Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Warzen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin[®] plus beachten?

Clabin[®] plus darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile von Clabin[®] plus sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Clabin[®] plus ist erforderlich:

Clabin[®] plus sollte nicht im Gesicht oder Genitalbereich angewendet werden.

Im Zweifelsfall ist der Arzt aufzusuchen.

Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen!

Warzen sind übertragbar! Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an Andere weitergegeben werden.

Bei Vorhandensein von Fußwarzen nicht barfuß gehen!

Bei Anwendung von Clabin[®] plus mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer lokal applizierter Arzneimittel durch die Haut verstärken.

Die resorbierte Salicylsäure kann die Wirksamkeit von Methotrexat und Sulfonylharnstoffen verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Clabin[®] plus sollte in der Schwangerschaft nur kleinflächig (max. 5 cm²) angewendet werden.

Clabin[®] plus darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. Wie ist Clabin[®] plus anzuwenden?

Wenden Sie Clabin[®] plus immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Clabin[®] plus ist zur Anwendung auf der Haut bestimmt.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Clabin[®] plus 2- bis 4-mal täglich auf die Warze(n) auftragen.

Vor dem erneuten Auftragen sollte der vorhandene Film durch Abziehen oder Abrubbeln entfernt werden. Clabin® plus Lösung sollte nicht auf die gesunde Haut in der Umgebung der Warze gelangen. Sie können diese mit einer fetthaltigen Creme schützen. Bei regelmäßiger Anwendung lässt sich die erweichte Hornschicht nach einigen Tagen mühelos entfernen.

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Warze abgetragen ist oder abfällt.

Bitte sprechen Sie mir Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Clabin® plus zu stark oder zu schwach ist.

Die Anwendung von Clabin® plus über einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen ist im Normalfall ausreichend. Wenden Sie Clabin® plus ohne ärztlichen Rat nicht länger an.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Clabin® plus Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Clabin® plus ruft gelegentlich leichtes und bei häufigerem Auftragen auch ein stärkeres Brennen besonders auf der die Warze umgebenden Haut hervor.

Ferner sind in sehr seltenen Fällen beschrieben worden: Überempfindlichkeitsreaktionen auf der Haut (allergische Kontaktdermatitis), Erweiterung kleiner, oberflächlicher Hautgefäße (Teleangiektasien), braune Flecke, Lichtempfindlichkeit mit Auftreten von Hauterscheinungen nach Sonnenbestrahlung (Photosensibilisierung), Hautentzündung (Dermatitis), Verdünnung der oberen Hautschichten, Pigmentierung, Depigmentierung.

Im Falle übermäßiger Reizung sollte die Behandlung zwischenzeitlich unterbrochen und nach Abklingen der Reaktion wieder aufgenommen werden. Im Falle ernsterer Nebenwirkungen als Reizungen suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Clabin® plus aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag im Monat.

Nicht über 25°C aufbewahren. Von offenem Feuer fernhalten!

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

Clabin® plus ist nach Anbruch 4 Monate haltbar.

Verschließen Sie nach Anwendung Clabin® plus gut und stellen Sie sicher, dass sich keine Lösung mehr am Flaschenhals befindet. So verhindern Sie ein Auskristallisieren von Clabin® plus und ein Verkleben der Öffnung.

6. Weitere Informationen

10 g Clabin® plus Lösung zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Wirkstoffe:

Milchsäure (Ph. Eur.) 1,67 g

Salicylsäure (Ph.Eur.) 1,67 g

Die sonstigen Bestandteile sind:

Elastisches Collodium (bestehend aus: Ethanol, Ether, Collodiumwolle, Kolophonium, Rizinusöl, Wasser).

Clabin® plus ist in Packungen mit 15 ml Lösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Deutsche Chefaro Pharma GmbH
45725 Waltrop
Tel.: 02309 / 640
Fax: 02309 / 64 424

Hersteller:

Pharbil Waltrop GmbH
Postfach 390 · 45724 Waltrop
Tel.: 02309 / 93750
Fax: 02309 / 937 53 92