



ZINKPASTE BW, 30 %

Paste zur Anwendung
auf der Haut

Wirkstoff:
Zinkoxid

100 g Paste enthalten den Wirkstoff: 30 g Zinkoxid.
Der sonstige Bestandteil ist: gelbes Vaseline.
Im Originalbehältnis fest verschlossen und für Kinder
unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.
Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.

Die Gebrauchsinformation finden Sie auf der Innenseite
dieses Etiketts.

Zul.-Nr.: 3004351.00.01

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170
01705 Freital, Deutschland

PZN 07714010, Art.-Nr. 30014401

Wundheilmittel / Hautschutzmittel

100 g

Apothekenpflichtig

Bombastus

Bombastus-Werke AG • 01705 Freital • Deutschland

Gebrauchsinformation

Zinkpaste BW, 30 %, Paste zur Anwendung auf der Haut, Wirkstoff: Zinkoxid

Anwendungsgebiete Zinkpaste BW ist ein Wundheilmittel / Hautschutzmittel. Diese Paste wird angewendet zur Abdeckung bzw. zum Schutz der gesunden Haut und zur Sekretbindung bei nässenden akuten und subakuten Dermatosen (Hautkrankheiten).

Gegenanzeigen Zinkpaste BW darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Zinkoxid oder den sonstigen Bestandteil von Zinkpaste BW sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Zinkpaste BW ist erforderlich, wenn die unter „Anwendungsgebiete“ beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker.

Wechselwirkungen Vor der Anwendung anderer äußerlich anzuwendender Arzneimittel (Externa) ist Zinkpaste BW vollständig zu entfernen, da sonst die Wirkung anderer Arzneimittel, die ebenfalls äußerlich aufgebracht werden sollen, eingeschränkt sein kann.

Hinweis: Zur Entfernung alter Pastenreste von der Haut werden diese mit einem fetten Öl (z. B. Erdnuss- oder Olivenöl) gelöst und vorsichtig mit Mull abgewischt.

Schwangerschaft und Stillzeit Zinkpaste BW kann bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Dosierungsanleitung in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Doch sollte eine großflächige Anwendung bei Schwangeren und eine großflächige Anwendung an der Brust bei stillenden Frauen vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen Bisher liegen keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor. Entsprechende Untersuchungen wurden mit Zinkpaste BW nicht durchgeführt.

Dosierung und Art der Anwendung Soweit nicht anders verordnet, wird Zinkpaste BW einmal oder mehrmals täglich auf die betroffenen Hautflächen aufgetragen. Das in Zinkpaste BW enthaltene Zinkoxid kann sich in der Wäsche festsetzen und ist dann nur schwer wieder zu entfernen. Decken sie daher die mit der Paste behandelte Hautfläche mit einer Mullkompressen, einem Pflaster oder einem Verband ab.

Dauer der Anwendung Die Dauer der Anwendung ist prinzipiell nicht begrenzt. Bitte beachten Sie aber die Angaben unter „Gegenanzeigen“ und „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“.

Überdosierung Wenn sich aufgrund einer Überdosierung Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise tritt die unter Nebenwirkungen aufgeführte Nebenwirkung verstärkt auf.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach Auftragen von Zinkpaste BW auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Aufbewahrung und Haltbarkeit Im Originalbehältnis fest verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Außenseite nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Zusammensetzung und Darreichungsform 100 g Paste enthalten den Wirkstoff: 30 g Zinkoxid. Der sonstige Bestandteil ist: gelbes Vaseline.

100 g Paste in einer Schraubdose.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller Bombastus-Werke AG, Wilsdruffer Straße 170, D-01705 Freital, Telefon: +49 351 65803-0, E-Mail: info@bombastus-werke.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2025.