

# Desloratadin HEXAL® 5 mg Filmtabletten

## Desloratadin

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Desloratadin HEXAL 5 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Desloratadin HEXAL 5 mg beachten?
3. Wie ist Desloratadin HEXAL 5 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Desloratadin HEXAL 5 mg aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen



## 1 Was ist Desloratadin HEXAL 5 mg und wofür wird es angewendet?

Desloratadin HEXAL 5 mg ist ein antiallergisches Arzneimittel, welches Sie nicht schläfrig macht. Es hilft, Ihre allergische Reaktion und Ihre Symptome zu kontrollieren.

Desloratadin HEXAL 5 mg verbessert die Symptome bei allergischer Rhinitis (durch eine Allergie hervorgerufene Entzündung der Nasengänge, beispielsweise Heuschnupfen oder Hausstaubmilben-Allergie). Diese Symptome beinhalten Niesen, laufende oder juckende Nase, Juckreiz am Gaumen und juckende, gerötete oder tränende Augen.

Desloratadin HEXAL 5 mg wird ebenfalls angewendet zur Beseitigung von mit Urtikaria (durch eine Allergie hervorgerufener Hautzustand) zusammenhängenden Symptomen. Diese Symptome beinhalten Juckreiz und Quaddeln.

Die Beseitigung dieser Symptome hält einen ganzen Tag an und hilft Ihnen, Ihre normale tägliche Aktivität und Ihren Schlaf wiederzufinden.

Desloratadin HEXAL 5 mg ist bei Erwachsenen und Jugendlichen (12 Jahre und älter) angezeigt.

## 2 Was sollten Sie vor der Einnahme von Desloratadin HEXAL 5 mg beachten?

### Desloratadin HEXAL 5 mg darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Desloratadin oder einen der sonstigen Bestandteile von Desloratadin HEXAL 5 mg oder gegen Loratadin sind.

### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Desloratadin HEXAL 5 mg einnehmen

- wenn Sie eine eingeschränkte Nierenfunktion haben.

Wenn dies auf Sie zutrifft, oder Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie Desloratadin HEXAL 5 mg einnehmen.

### Einnahme von Desloratadin HEXAL 5 mg zusammen mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen von Desloratadin HEXAL 5 mg mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

**Einnahme von Desloratadin HEXAL 5 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**  
Desloratadin HEXAL 5 mg kann unabhängig von den Mahlzeiten eingenommen werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Von einer Anwendung von Desloratadin HEXAL 5 mg in der Schwangerschaft und Stillzeit wird abgeraten.

### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei Anwendung in der empfohlenen Dosierung ist nicht damit zu rechnen, dass Desloratadin HEXAL 5 mg zu Benommenheit führt oder die Aufmerksamkeit herabsetzt. Sehr selten entwickeln jedoch manche Personen Benommenheit, die zu einer Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit oder der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen führen kann.

## 3 Wie ist Desloratadin HEXAL 5 mg einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

### Die übliche Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche (12 Jahre und älter): Eine Filmtablette 1-mal täglich einnehmen.

Die Filmtablette während oder zwischen den Mahlzeiten schlucken.

Bezüglich der **Behandlungsdauer** wird Ihr Arzt die Art der allergischen Rhinitis feststellen, unter der Sie leiden und wird danach festlegen, wie lange Sie Desloratadin HEXAL 5 mg einnehmen sollen.

- Wenn Ihre **allergische Rhinitis intermittierend** ist (die Symptome seltener als 4 Tage pro Woche auftreten oder weniger als 4 Wochen andauern), wird Ihr Arzt Ihnen ein Behandlungsschema empfehlen, das abhängig von Ihrem bisherigen Krankheitsverlauf ist.
- Wenn Ihre **allergische Rhinitis persistierend** ist (die Symptome an 4 oder mehr Tagen pro Woche auftreten und mehr als 4 Wochen andauern), kann Ihr Arzt Ihnen eine länger dauernde Behandlung empfehlen.
- Bei **Urtikaria** kann sich die Behandlungsdauer von Patient zu Patient unterscheiden. Deshalb sollten Sie die Anweisungen Ihres Arztes befolgen.

### Wenn Sie eine größere Menge von Desloratadin HEXAL 5 mg eingenommen haben, als Sie sollten

Nehmen Sie Desloratadin HEXAL 5 mg nur in der Ihnen verschriebenen Menge ein. Bei einer versehentlichen Überdosis ist mit keinen schweren Problemen zu rechnen. Wenn Sie mehr Desloratadin HEXAL 5 mg eingenommen haben, als Sie sollten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Wenn Sie die Einnahme von Desloratadin HEXAL 5 mg vergessen haben

Wenn Sie vergessen haben, Ihre Dosis rechtzeitig einzunehmen, nehmen Sie sie so bald wie möglich ein, und folgen Sie dann wieder dem normalen Behandlungsplan. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

- Bei Erwachsenen waren die Nebenwirkungen ähnlich wie mit Placebo. Jedoch wurden Müdigkeit, Mundtrockenheit und Kopfschmerzen öfter berichtet als mit Placebo.
- Bei Jugendlichen waren Kopfschmerzen die am häufigsten berichtete Nebenwirkung.

Nach Markteinführung von Desloratadin wurden folgende Nebenwirkungen sehr selten (bei weniger als 1 Behandelten von 10.000) berichtet:

- **schwere allergische Reaktionen** (Schwierigkeiten beim Atmen, pfeifendes Atmen, Jucken, Nesselausschlag und Schwellungen) und Hautausschlag. Wenn eines dieser Symptome auftritt, **beenden Sie die Einnahme** des Arzneimittels und **suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf**.
- Herzklopfen, Herzjagen
- Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Magenverstimmung, Durchfall
- Schwindel, Benommenheit, Schlaflosigkeit
- Muskelschmerzen, Halluzinationen, Anfälle, Rastlosigkeit mit vermehrter körperlicher Aktivität
- Leberentzündung und ungewöhnliche Leberfunktionswerte

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

## 5 Wie ist Desloratadin HEXAL 5 mg aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen Desloratadin HEXAL 5 mg nach dem auf der Faltschachtel und der Blisterpackung nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nicht verwenden, wenn Sie eine Veränderung des Aussehens der Tabletten bemerken.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6 Inhalt der Packung und weitere Informationen

### Was Desloratadin HEXAL 5 mg enthält

- Der Wirkstoff ist Desloratadin.  
Jede Filmtablette enthält 5 mg Desloratadin.
- Die sonstigen Bestandteile sind:  
*Tablettenkern:* Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, Hypromellose, hochdisperses Siliciumdioxid, hydriertes Pflanzenöl (Typ 1)  
*Filmüberzug:* Opadry blau bestehend aus: Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Macrogol 400 (E1521), Indigocarmin, Aluminiumsalz (E132)

### Wie Desloratadin HEXAL 5 mg aussieht und Inhalt der Packung

Desloratadin HEXAL 5 mg Filmtabletten sind hellblaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „5“ auf einer Seite. Durchmesser 6,50 ± 0,10 mm.

Desloratadin HEXAL 5 mg Filmtabletten ist erhältlich in Blisterpackungen aus OPA/ALU/PVC/ALU.

Packungsgrößen:  
20, 50 und 100 Filmtabletten

### Pharmazeutischer Unternehmer

Hexal AG  
Industriestraße 25  
83607 Holzkirchen  
Telefon: (08024) 908-0  
Telefax: (08024) 908-1290  
E-Mail: service@hexal.com

### Hersteller

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova 57  
1526 Ljubljana  
Slowenien

### Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Dänemark Desloratadine Hexal  
Deutschland Desloratadin HEXAL 5 mg Filmtabletten

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2012.**

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und Hexal wünschen gute Besserung!